

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNOLOGIJO
Oddelek za fiziko

Peter Prelovšek in Ivan Kuščer

ZBIRKA FORMUL ZA VEKTORJE IN TENZORJE

Društvo matematikov, fizikov in astronomov SRS
Ljubljana 1982

25.

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNOLOGIJO
Oddelek za fiziko

Peter Prelovšek in Ivan Kuščer

ZBIRKA FORMUL ZA
VEKTORJE IN TENZORJE

Društvo matematikov, fizikov in astronomov SRS
Ljubljana 1982

UDK 51

Math.Subj.Class.(1980) 15 A 72, 90
53 A 45

c 1979, 1982 Društvo matematikov, fizikov in
astronomov SR Slovenije - 547

1. Kartezične komponente

vektor:


$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \quad a_1 = a_x = \vec{a} \cdot \vec{e}_1 \quad \text{itd.}$$

$$\vec{e}_1 = (1, 0, 0) \quad \text{itd.}$$

tenzor:

$$\underline{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix} = \sum_{ij} A_{ij} \vec{e}_i \otimes \vec{e}_j$$

$$A_{ij} = \vec{e}_i \cdot (\underline{A} \vec{e}_j) = (\vec{e}_i \underline{A}) \cdot \vec{e}_j$$



adjungirani (transponirani) tenzor:

$$\underline{A}^\dagger = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}, \quad A^\dagger_{ij} = A_{ji}, \quad (\underline{A}^\dagger)^\dagger = \underline{A}$$

2. Seštevanje

$$(\vec{a} + \vec{b})_i = a_i + b_i, \quad (\underline{A} + \underline{B})_{ij} = A_{ij} + B_{ij}$$

3. Produkti

skalarni:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = ab \cos(\vec{a}, \vec{b}) = \vec{b} \cdot \vec{a}$$

vektorski:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right) = - \vec{b} \times \vec{a}$$

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = ab \sin(\vec{a}, \vec{b})$$

tenzorski:

$$\vec{a} \otimes \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & a_2 b_3 \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & a_3 b_3 \end{pmatrix} = (\vec{b} \otimes \vec{a})^\dagger$$

produkt tenzorjev:

$$\underline{A}\underline{B} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_j A_{1j}B_{j1}, \dots \\ \dots \\ \dots \end{pmatrix}$$

$$(\underline{A}\underline{B})_{ik} = \sum_j A_{ij}B_{jk},$$

$$(\underline{A}\underline{B})^{\dagger} = \underline{B}^{\dagger}\underline{A}^{\dagger}$$

produkt tenzorja z vektorjem:

$$\underline{A}\vec{b} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \left(\sum_j A_{1j}b_j, \dots, \dots \right) = \vec{b}\underline{A}^{\dagger}$$

$$\vec{b}\underline{A} = (b_1, b_2, b_3) \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix} = \left(\sum_i b_i A_{i1}, \dots, \dots \right) = \underline{A}^{\dagger}\vec{b}$$

$$(\underline{A}\vec{b})_i = \sum_j A_{ij}b_j, \quad (\vec{b}\underline{A})_j = \sum_i b_i A_{ij}$$

vektorski produkt tenzorja z vektorjem:

$$\underline{A} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} A_{12}b_3 - A_{13}b_2, & A_{13}b_1 - A_{11}b_3, & A_{11}b_2 - A_{12}b_1 \\ A_{22}b_3 - A_{23}b_2, & A_{23}b_1 - A_{21}b_3, & A_{21}b_2 - A_{22}b_1 \\ A_{32}b_3 - A_{33}b_2, & A_{33}b_1 - A_{31}b_3, & A_{31}b_2 - A_{32}b_1 \end{pmatrix} = \underline{A}(\vec{b} \times \underline{1})$$

$$\vec{b} \times \underline{A} = -(\underline{A}^{\dagger} \times \vec{b})^{\dagger}$$

vsi produkti so distributivni

4. Posebni tenzorji

$$\text{enotni (identiteta): } \underline{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \sum_i \vec{e}_i \otimes \vec{e}_i$$

$$\text{izotropen: } \underline{A} = \lambda \underline{1}$$

$$\text{simetričen (sebi adjungiran): } \underline{A} = \underline{A}^{\dagger}$$

antisimetričen in ustrezeni vektor:

$$\underline{A} = -\underline{A}^{\dagger} = \vec{a} \times \underline{1} = \begin{pmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{a} = (-A_{23}, A_{13}, -A_{12})$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \underline{A}\vec{b} = (\vec{a} \times \underline{1})\vec{b}$$

unitaren: $\underline{A}\underline{A}^\dagger = \underline{A}^\dagger\underline{A} = \underline{1}$

5. Vrtenje koordinatnega sistema


$$\vec{a} = \sum_j a_j \vec{e}_j = \sum_j (\vec{a} \cdot \vec{e}_j) \vec{e}_j$$

$$a'_i = \vec{a} \cdot \vec{e}'_i = \sum_j (\vec{e}'_i \cdot \vec{e}_j) (\vec{a} \cdot \vec{e}_j) = \sum_j \alpha_{ij} a_j$$

$$\alpha_{ij} = \vec{e}'_i \cdot \vec{e}_j = \cos(\vec{e}'_i, \vec{e}_j)$$

$$\underline{\alpha}\underline{\alpha}^\dagger = \underline{\alpha}^\dagger\underline{\alpha} = \underline{1}$$

$$A'_{ij} = \sum_{k,l} \alpha_{ik} A_{kl} \alpha_{lj}^\dagger$$



6. Invariante pri vrtenju

$$a \equiv |\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

$$\text{Tr}(\underline{A}) = A_{11} + A_{22} + A_{33}$$

$$\det(\underline{A}) = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix}$$

$$\det(\underline{AB}) = \det(\underline{A})\det(\underline{B})$$

$$\det(\vec{a} \otimes \vec{b}) = 0$$

$$\text{Tr}(\vec{a} \otimes \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{b}$$

7. Lastne vrednosti sebi adjungiranega tenzorja

$$\underline{A}\vec{w} = \lambda\vec{w} \Rightarrow \exists \vec{w} \neq 0 \text{ \u0161e } \det(\underline{A} - \lambda\underline{1}) = 0$$

\u010de $\underline{A} = \underline{A}^\dagger \Rightarrow$ 3 realni koreni $\lambda_I, \lambda_{II}, \lambda_{III}$ (lastne vrednosti \underline{A} -ja)

ustrezni lastni vektorji: $\vec{w}_I, \vec{w}_{II}, \vec{w}_{III}$

jih normiramo in, \u010de treba, ortogonaliziramo: $\vec{w}_i \cdot \vec{w}_j = \delta_{ij}$

$$\text{Tr}(\underline{A}) = \lambda_I + \lambda_{II} + \lambda_{III}$$

$$\det(\underline{A}) = \lambda_I \lambda_{II} \lambda_{III}$$

8. Večkratni produkti

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$$

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a}$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = 0$$

$$\vec{a} = \vec{u}(\vec{a} \cdot \vec{u}) + \vec{u} \times (\vec{a} \times \vec{u}), \text{ če } |\vec{u}| = 1$$

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = \begin{vmatrix} \vec{a} \cdot \vec{c} & \vec{a} \cdot \vec{d} \\ \vec{b} \cdot \vec{c} & \vec{b} \cdot \vec{d} \end{vmatrix}$$

$$(\vec{a} \otimes \vec{b})\vec{c} = \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c}) = \vec{c}(\vec{b} \otimes \vec{a})$$

$$(\vec{a} \otimes \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \otimes (\vec{b} \times \vec{c})$$

produkt tenzorjev je asociativen, produkt tenzorjev in vektorjev pa ne vedno:

$$(\underline{A}\underline{B})\underline{C} = \underline{A}(\underline{B}\underline{C}) = \underline{A}\underline{B}\underline{C}$$

$$\vec{a} \cdot (\underline{B}\vec{c}) = (\vec{a}\underline{B}) \cdot \vec{c}, \quad \underline{A}(\underline{B}\vec{c}) = (\underline{A}\underline{B})\vec{c} = \underline{A}\underline{B}\vec{c}, \quad \vec{a}(\underline{B}\underline{C}) = (\vec{a}\underline{B})\underline{C} = \vec{a}\underline{B}\underline{C}$$

toda na splošno $\underline{A}(\vec{b}\underline{C}) \neq (\vec{a}\underline{B})\underline{C}$ in seveda $(\vec{a} \cdot \vec{b})\underline{C} \neq \vec{a} \cdot (\vec{b}\underline{C})$

9. Definicije odvodov

gradient skalarja:

$$df(\vec{r}) = d\vec{r} \cdot \nabla f = d\vec{r} \cdot \text{grad } f, \quad \vec{n} \cdot \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial s} \right)_{\vec{n}}, \text{ če } |\vec{n}| = 1$$

odvod vektorja v predpisani smeri:

$$d\vec{v}(\vec{r}) = (d\vec{r} \cdot \nabla)\vec{v}, \quad (\vec{n} \cdot \nabla)\vec{v} = \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial s} \right)_{\vec{n}}, \text{ če } |\vec{n}| = 1$$

divergenca vektorja:

$$\nabla \cdot \vec{v}(\vec{r}) = \text{div } \vec{v}(\vec{r}) = \lim_{\max|\vec{r}' - \vec{r}| \rightarrow 0} \frac{1}{V} \oint d\vec{S}' \cdot \vec{v}(\vec{r}')$$

divergenca tenzorja:

$$\nabla \underline{A}(\vec{r}) = \text{div } \underline{A}(\vec{r}) = \lim_{\max|\vec{r}' - \vec{r}| \rightarrow 0} \frac{1}{V} \oint d\vec{S}' \underline{A}(\vec{r}')$$

(integrala po površini, ki objema prostornino V, vektor $d\vec{S}'$ obrnjen pravokotno navzven)

rotor:

$$\vec{n} \cdot (\nabla \times \vec{v}(\vec{r})) = \vec{n} \cdot \text{rot } \vec{v}(\vec{r}) = \lim_{\max |\vec{r} - \vec{r}'| \rightarrow 0} \frac{1}{S} \oint \vec{dr}' \cdot \vec{v}(\vec{r}')$$

(integral po ravni zanki, ki objema ploščino S in ima normalo \vec{n} , obrnjeno po svedrskem pravilu)

gradient vektorja:

$$\vec{n}(\nabla \otimes \vec{v}) = (\vec{n} \cdot \nabla) \vec{v}$$

simetriziran gradient vektorja (deformacija):

$$\text{def } \vec{v} = \frac{1}{2} [\nabla \otimes \vec{v} + (\nabla \otimes \vec{v})^T]$$

$$\text{Tr}(\text{def } \vec{v}) = \nabla \cdot \vec{v}$$

10. Odvodi posebnih izrazov in produktov

$$\nabla f(g(\vec{r})) = f'(g) \nabla g(\vec{r}), \quad \nabla f(r) = f'(r) \vec{r}/r$$

$$\nabla(\vec{a} \cdot \vec{r}) = \vec{a}$$

$$\nabla \cdot \vec{r} = 3, \quad \nabla \times \vec{r} = 0, \quad (\vec{c} \cdot \nabla) \vec{r} = \vec{c}$$

$$\nabla \cdot (\vec{a} \times \vec{r}) = 0, \quad \nabla \times (\vec{a} \times \vec{r}) = 2\vec{a}, \quad (\vec{c} \cdot \nabla) (\vec{a} \times \vec{r}) = \vec{a} \times \vec{c}$$

$$\nabla(f \underline{1}) = \nabla f, \quad \nabla(\vec{v} \times \underline{1}) = \nabla \times \vec{v}$$

$$\nabla(fg) = f \nabla g + g \nabla f$$

$$\nabla(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (\vec{u} \cdot \nabla) \vec{v} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{u} + \vec{u} \times (\nabla \times \vec{v}) + \vec{v} \times (\nabla \times \vec{u})$$

$$\nabla(v^2/2) = (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} + \vec{v} \times (\nabla \times \vec{v})$$

$$\nabla \cdot (f \vec{v}) = f \nabla \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \nabla f$$

$$\nabla \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = \vec{v} \cdot (\nabla \times \vec{u}) - \vec{u} \cdot (\nabla \times \vec{v})$$

$$\nabla \times (f \vec{v}) = f \nabla \times \vec{v} - \vec{v} \times \nabla f$$

$$\nabla \times (\vec{u} \times \vec{v}) = (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{u} - (\vec{u} \cdot \nabla) \vec{v} + \vec{u}(\nabla \cdot \vec{v}) - \vec{v}(\nabla \cdot \vec{u})$$

$$(\vec{u} \cdot \nabla) f \vec{v} = \vec{v}(\vec{u} \cdot \nabla f) + f(\vec{u} \cdot \nabla) \vec{v}$$

$$\nabla(\underline{u} \otimes \underline{v}) = \underline{v}(\nabla \cdot \underline{u}) + (\underline{u} \cdot \nabla) \underline{v}$$

$$\nabla(f \underline{A}) = (\nabla f) \underline{A} + f (\nabla \underline{A})$$

$$\nabla \cdot (\underline{A} \underline{v}) = \underline{v} \cdot (\nabla \underline{A}) + \text{Tr}(\underline{A} \text{ def } \underline{v}), \text{ če } \underline{A} = \underline{A}^T$$

11. Drugi odvodi

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f$$

$$\nabla^2 \underline{v} = \nabla(\nabla \otimes \underline{v}) = \nabla(\nabla \cdot \underline{v}) - \nabla \times (\nabla \times \underline{v})$$

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \underline{v}) = 0$$

$$\nabla(\text{def } \underline{v}) = \frac{1}{2} \nabla^2 \underline{v} + \frac{1}{2} \nabla(\nabla \cdot \underline{v})$$

12. Integralne formule

Gaussovi izreki (integral po zaključeni ploskvi = integral po objeti prostornini):

$$\oint d\vec{S} f = \int dV \nabla f$$

$$\oint d\vec{S} \cdot \underline{v} = \int dV \nabla \cdot \underline{v}$$

z $\underline{v} = f \nabla g - g \nabla f$ dobimo Greenovo formulo:

$$\oint d\vec{S} \cdot (f \nabla g - g \nabla f) = \int dV (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f)$$

$$\oint d\vec{S} \times \underline{v} = \int dV \nabla \times \underline{v}$$

$$\oint (\vec{a} \cdot d\vec{S}) \underline{v} = \int dV (\vec{a} \cdot \nabla) \underline{v}, \text{ če } \vec{a} = \text{const}$$

$$\oint d\vec{S} \underline{A} = \int dV \nabla \underline{A}$$

Stokesovi izreki (integral po zanki = integral po objeti ploskvi):

$$\oint d\vec{r} \cdot \underline{v} = \int d\vec{S} \cdot (\nabla \times \underline{v})$$

$$\oint d\vec{r} \times \underline{v} = \int (d\vec{S} \times \nabla) \times \underline{v}$$

$$\oint d\vec{r} f = \int d\vec{S} \times \nabla f$$

13. Odvodi v raznih pravokotnih koordinatnih sistemih

splošne koordinate: $q_1(\mathbf{r}), q_2(\mathbf{r}), q_3(\mathbf{r})$

$$\nabla q_i = \mathbf{e}_i(\mathbf{r})/h_i(\mathbf{r}), \quad \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}, \quad \mathbf{v}(\mathbf{r}) = \sum_i v_i(\mathbf{r}) \mathbf{e}_i(\mathbf{r})$$

$$d\mathbf{r} = \sum_i h_i \mathbf{e}_i dq_i, \quad dV = h_1 h_2 h_3 dq_1 dq_2 dq_3$$

$$\nabla f = \frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial q_1} \mathbf{e}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial q_2} \mathbf{e}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial q_3} \mathbf{e}_3$$

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_1} (h_2 h_3 v_1) + \frac{\partial}{\partial q_2} (h_3 h_1 v_2) + \frac{\partial}{\partial q_3} (h_1 h_2 v_3) \right]$$

$$\nabla \times \mathbf{v} = \frac{1}{h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_2} (h_3 v_3) - \frac{\partial}{\partial q_3} (h_2 v_2) \right] \mathbf{e}_1 + \frac{1}{h_3 h_1} \left[\frac{\partial}{\partial q_3} (h_1 v_1) - \frac{\partial}{\partial q_1} (h_3 v_3) \right] \mathbf{e}_2 + \frac{1}{h_1 h_2} \left[\frac{\partial}{\partial q_1} (h_2 v_2) - \frac{\partial}{\partial q_2} (h_1 v_1) \right] \mathbf{e}_3$$

$$\nabla^2 f = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial f}{\partial q_1} \right) + \frac{\partial}{\partial q_2} \left(\frac{h_3 h_1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial q_2} \right) + \frac{\partial}{\partial q_3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial f}{\partial q_3} \right) \right]$$

kartezične koordinate: $q_1 = x, q_2 = y, q_3 = z$

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{e}_z$$

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$$

$$\nabla \times \mathbf{v} = \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) \mathbf{e}_x + \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \right) \mathbf{e}_y + \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) \mathbf{e}_z$$

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

$$\nabla^2 \mathbf{v} = \frac{\partial^2 \mathbf{v}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{v}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{v}}{\partial z^2}$$

$$\nabla \underline{A} = \left(\frac{\partial A_{11}}{\partial x} + \frac{\partial A_{21}}{\partial y} + \frac{\partial A_{31}}{\partial z}, \dots, \dots \right)$$


$$(\nabla \otimes \mathbf{v})_{ij} = \frac{\partial v_j}{\partial x_i}, \quad \text{def } \mathbf{v} = \begin{pmatrix} \frac{\partial v_x}{\partial x} & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial x} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x} \right) & \frac{\partial v_y}{\partial y} & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_y}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial y} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial x} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_y}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial y} \right) & \frac{\partial v_z}{\partial z} \end{pmatrix}$$

cilindrične koordinate:

$$q_1 = \rho, q_2 = \varphi, q_3 = z$$

$$h_1 = 1, h_2 = \rho, h_3 = 1$$

$$dV = \rho \, d\rho \, d\varphi \, dz$$



$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial \rho} \vec{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z$$

$$\nabla \cdot \vec{v} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho v_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial v_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$$

$$\nabla \times \vec{v} = \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial v_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial v_\varphi}{\partial z} \right) \vec{e}_\rho + \left(\frac{\partial v_\rho}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial \rho} \right) \vec{e}_\varphi + \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial(\rho v_\varphi)}{\partial \rho} - \frac{\partial v_\rho}{\partial \varphi} \right) \vec{e}_z$$

$$\nabla^2 f = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial f}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$


$$\nabla^2 \vec{v} = \left(\nabla^2 v_\rho - \frac{v_\rho}{\rho^2} - \frac{2}{\rho^2} \frac{\partial v_\varphi}{\partial \varphi} \right) \vec{e}_\rho + \left(\nabla^2 v_\varphi - \frac{v_\varphi}{\rho^2} + \frac{2}{\rho^2} \frac{\partial v_\rho}{\partial \varphi} \right) \vec{e}_\varphi + \nabla^2 v_z \vec{e}_z$$

kugelne koordinate:

$$q_1 = r, q_2 = \vartheta, q_3 = \varphi$$

$$h_1 = 1, h_2 = r, h_3 = r \sin \vartheta$$

$$dV = r^2 dr \, d(\cos \vartheta) \, d\varphi$$



$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \vartheta} \vec{e}_\vartheta + \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$\nabla \cdot \vec{v} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) + \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} (\sin \vartheta v_\vartheta) + \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial v_\varphi}{\partial \varphi}$$

$$\nabla \times \vec{v} = \frac{1}{r \sin \vartheta} \left[\frac{\partial}{\partial \vartheta} (\sin \vartheta v_\varphi) - \frac{\partial v_\varphi}{\partial \varphi} \right] \vec{e}_r + \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial v_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial (r v_\varphi)}{\partial r} \right] \vec{e}_\vartheta + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial (r v_\vartheta)}{\partial r} - \frac{\partial v_r}{\partial \vartheta} \right] \vec{e}_\varphi$$

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial f}{\partial r}) + \frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} (\sin \vartheta \frac{\partial f}{\partial \vartheta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$$

PREDGOVOR

Zbirka podaja v strnjeni obliki tiste formule za vektorje in za tenzorje 2. reda (kvadratne matrike), ki se pogosto rabijo. Namenjena je uporabniku, ki pojme že pozna, tako da mu zadošča jo prav skopa besedna pojasnila. Pisava brez komponent, ki ni odvisna od izbire koordinatnega sistema, naj vzpodbuja k nazorni predstavi.

Znamenja se večji del ravna po prevladujoči rabi v fizikalni literaturi. Skalarni, vektorski in tenzorski produkt dveh vektorjev zaznamujeva s \cdot , \times in \otimes . Produkte s skalarji pa piševa brez ločila in ravno tako matrične produkte (tenzorja s tenzorjem in tenzorja z vektorjem). Izogibava se razlikovanja "vektorjev vrstic" in "vektorjev stolpičev".

Omejila sva se na 3-dimenzionalni evklidski prostor; vendar se bo uporabnik sam znašel z nekaterimi posplošitvami. V več dimenzijah zavržemo vektorski produkt, medtem ko ohranimo vse ostalo. V kompleksnih prostorih je treba npr. pri drugem faktorju skalarnega produkta in pri komponentah adjungiranega tenzorja (ki se ne ujema več s transponiranim tenzorjem) vstavljati konjugirano kompleksne vrednosti, takole:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_i u_i v_i^* = (\vec{v} \cdot \vec{u})^* , \quad A_{ij}^\dagger = A_{ji}^* .$$

V Hilbertovem prostoru, kjer tenzorjem ustrezajo operatorji, pišemo po navadi (\vec{u}, \vec{v}) ali $\langle \vec{v} | \vec{u} \rangle$ namesto $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Izmed uporabljenih virov naj omeniva naslednje:

E. Madelung: Die mathematischen Hilfsmittel des Physikers. Springer, Berlin 1957.

G. A. Korn, T. M. Korn: Mathematical Handbook for Scientists and Engineers. McGraw-Hill, New York 1968.

P. M. Morse, H. Feshbach: Methods of Theoretical Physics. McGraw-Hill, New York 1953.

Rada bi se zahvalila Egonu Zakrajšku za temeljit pregled rokopisa in za nasvete, s katerimi nama je pomagal odpraviti več nedoslednosti.

Peter Prelovšek, Ivan Kuščer

ZBIRKA IZBRANIH POGLAVIJ IZ FIZIKE

Izdajata: Oddetek za fiziko FNT in
Društvo matematikov, fizikov in astronomov SRS

Odgovorni urednik Janez Strnad

13.a.

Peter Prelovšek in Ivan Kuščer

ZBIRKA FORMUL ZA VEKTORJE IN TENZORJE

Strokovni pregled Egon Zakrajšek

Izdalo Društvo matematikov, fizikov in astronomov SRS
Urednik Ciril Velkovich

Natisnila DDU Univerzum
v Ljubljani 1982
Naklada 200 izvodov

PRELOVŠEK Peter

Zbirka formul za vektorje in tenzorje /
Peter Prelovšek, Ivan Kuščer. - 2. natis. -
Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in
astronomov SRS, 1982. - 12 str. ; 23 cm. -
(Zbirka izbranih poglavij iz fizike ; 13.a)

ZBIRKA IZBRANIH POGLAVIJ IZ FIZIKE

Odgovorni urednik Janez Strnad

Izdajata: Oddelek za fiziko FNT in

Društvo matematikov, fizikov in astronomov SRS

1. Vaje iz fizike. 1947
2. Strnad J., Uvod v fiziko, 1. del. 1968, 1971
3. Rosina M., Jedrska fizika. 1969, 1971, 1981
4. Strnad J., Uvod v fiziko, 2. del. 1969, 1971
5. Kuščer I., Matematične naloge iz fizike, 1. del. 1972
6. Kuščer I., Matematične naloge iz fizike, 2. del. 1972
7. Strnad J., Moderna fizika, 1. del. 1972, 1975
8. Strnad J., Moderna fizika, 2. del. 1973, 1977
9. Gros M. in dr., Naloge iz fizike. 1972, 1973, 1980, 1981
10. Kuščer I., Žumer S., Termodinamika. 1974
11. Kuščer I., Žumer S., Statistična mehanika. 1977, 1981
12. Ahlin F. in dr., Izpitna vprašanja iz fizike, 6. natis. 1977
13. Prelovšek P., Kuščer I., Zbirka formul za vektorje in tenzorje. 1979, 1982
14. Rosina M., Osnovni delci – zbirka tabel in nalog. 1969, 1978, 1979
15. Kuščer I., Pregled klasične fizike. 1979
16. Kuščer I., Matematične naloge iz fizike (2. popravljena in dopolnjena izdaja). 1979
17. Stepišnik J. in dr., Fizikalni praktikum I. 1947, 1966, 1980
18. Zupančič I., Fizikalni praktikum II. 1981